

Lec-2. 等可能概型（古典概型）

主讲教师：吴利苏 (wulisu@sdust.edu.cn)

主页：wulisu.cn

目录

1. 古典概型

2. 例子

- 取球模型
- 超几何分布问题
- 球放杯子模型

- 生日问题
- 分房问题
- 抽签问题
- 随机数整除模型
- 配对问题

引例

- 抛硬币观察正反面，样本空间

$$S = \{H, T\}.$$

- 掷骰子观察点数，样本空间

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

古典概型

共同点:

- (有限性) 样本空间 S 中样本点有限.
- (等可能性) 出现每一个样本点的概率相等.

古典概型

共同点:

- (有限性) 样本空间 S 中样本点有限.
- (等可能性) 出现每一个样本点的概率相等.

满足以上两个特点的试验称为等可能概型(古典概型).

古典概型概率计算公式

设古典概型的样本空间 $S = \{e_1, \dots, e_n\}$ 由 n 个样本点构成, A 为任一包含 m 个样本点的事件, 则事件 A 的概率为

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{A \text{ 所包含样本点的个数}}{\text{样本点总数}}.$$

例 (取球模型)

设袋中有 6 只球, 其中 4 只白球, 2 只红球, 从袋中取球两次, 每次随机取一只.

- 无放回取样, 第一次取一只球, 不放回, 第二次从剩余的球中再取一球.
- 放回抽样, 第一次取一只球, 放回, 第二次从全部的球中再取一球.

求

- (1) 取到两只白球的概率.
- (2) 取到两只同色球的概率.
- (3) 取到两次球中至少有一只白球的概率.

解: 设 A 表示事件取到两只白球, B 表示事件取到两只同色球, C 表示事件至少有一只白球.

(a) 无放回取样:

(1) 样本空间中的元素为 $6 \times 5 = 30$, 事件 A 包含 $4 \times 3 = 12$, 则 $P(A) = \frac{4 \times 3}{6 \times 5} = \frac{2}{5}$.

(2) $P(B) = \frac{2 \times 1}{6 \times 5} = \frac{1}{15}$, $P(A) + P(B) = \frac{7}{15}$.

(3) $P(C) = 1 - P(B) = \frac{14}{15}$. 或者

$$P(C) = \frac{4 \times 3}{6 \times 5} + \frac{4 \times 2}{6 \times 5} + \frac{2 \times 4}{6 \times 5} = \frac{14}{15}.$$

(b) 放回抽样:

(1) 样本空间中的元素为 $6 \times 6 = 36$, 事件 A 包含 $4 \times 4 = 16$, 则 $P(A) = \frac{4 \times 4}{6 \times 6} = \frac{4}{9}$.

(2) $P(B) = \frac{2 \times 2}{6 \times 6} = \frac{1}{9}$, $P(A) + P(B) = \frac{5}{9}$.

(3) $P(C) = 1 - P(B) = \frac{8}{9}$.

□

例

一般地, 设有 N 个球, 其中 a 个白球, $b = N - a$ 个红球, 采用不放回抽样, 取 n 个球 ($n \leq N$), 求恰好取到 k 个白球的概率 ($k \leq a$).

例

一般地, 设有 N 个球, 其中 a 个白球, $b = N - a$ 个红球, 采用不放回抽样, 取 n 个球 ($n \leq N$), 求恰好取到 k 个白球的概率 ($k \leq a$).

解: 记 $A_k = \{\text{恰好取到 } k \text{ 个白球}\}$,

总样本点 $C_N^m = \frac{N!}{n!(N-n)!}$,

$$P(A_k) = \frac{C_a^k C_b^{m-k}}{C_N^m}.$$

□

例 (超几何分布问题)

设 N 件产品, 其中有 D 件次品, 从中取出 n 件, 问其中恰有 k ($k \leq D$) 件次品的概率是多少?

例 (超几何分布问题)

设 N 件产品, 其中有 D 件次品, 从中取出 n 件, 问其中恰有 k ($k \leq D$) 件次品的概率是多少?

解:
$$P = \frac{C_D^k C_{N-D}^{n-k}}{C_N^n}.$$



练习

掷 3 颗均匀的骰子, 求点数之和为 4 的概率.

练习

掷 3 颗均匀的骰子, 求点数之和为 4 的概率.

解: 记 A 为事件点数之和为 4.

样本空间中的元素为个数 $6 \times 6 \times 6$,

A 包含 $\{1, 1, 2\}$, $\{1, 2, 1\}$, $\{2, 1, 1\}$.

$$P(A) = \frac{3}{6 \times 6 \times 6} = \frac{1}{72}.$$

□

例 (球放杯子模型)

(1) 杯子容量无限, 把 4 个球放到 3 个杯子中, 求第 1, 2 个杯子中各有两个球的概率.

(2) 每个杯子只放一个球, 把 4 个球放到 10 个杯子中, 求第 1 至第 4 个杯子各放一个球的概率.

解: (1) 记 $A = \{\text{第 1, 2 个杯子中各有两个球}\}$.
总样本点 3^4 , A 包含 $C_4^2 C_2^2$,

$$P(A) = \frac{C_4^2 C_2^2}{3^4} = \frac{2}{27}.$$

(2) 记 A 为事件第 1 至第 4 个杯子中各有一个球. 总样本点 $10 \times 9 \times 8 \times 7$, A 包含 $4 \times 3 \times 2 \times 1$

$$P(A) = \frac{4 \times 3 \times 2 \times 1}{10 \times 9 \times 8 \times 7} = \frac{1}{210}.$$

□

例 (生日问题)

某班 20 个学生都是同一年出生的, 求

- (1) 有 10 个学生生日是 1 月 1 日, 另外 10 个是 12 月 31 日的概率.
- (2) 至少有两人生日相同的概率?

例 (生日问题)

某班 20 个学生都是同一年出生的, 求

- (1) 有 10 个学生生日是 1 月 1 日, 另外 10 个是 12 月 31 日的概率.
- (2) 至少有两人生日相同的概率?

解: 记 A 为事件: 有 10 个学生生日是 1 月 1 日, 另外 10 个是 12 月 31 日.

$$P(A) = \frac{C_{20}^{10} C_{10}^{10}}{365^{20}}.$$

记 B 为事件: 至少有两人生日相同.

$$P(B) = 1 - \frac{365 \times 364 \times \dots \times (365 - 19)}{365^{20}}.$$

例 (分房问题)

将张三, 李四, 王五 3 人等可能地分配到 3 间房中, 试求每个房间恰有一人的概率.

例 (分房问题)

将张三, 李四, 王五 3 人等可能地分配到 3 间房中, 试求每个房间恰有一人地概率.

解: $P = \frac{3 \times 2}{3^3} = \frac{2}{9}.$



例 (抽签问题)

袋中有 a 只白球, b 只红球, k ($k \leq a + b$) 个人依次在袋中取一只球.

- 放回抽样;
- 不放回抽样.

求第 i 个人取到白球的概率.

解: (1) $p = \frac{a}{a+b}$.

(2) 总样本点 $(a+b)(a+b-1)\dots(a+b-k+1) = A_{a+b}^k$.

第 i 个取到白球 $C_a^1 A_{a+b-1}^{k-1}$

$$P = \frac{aA_{a+b-1}^{k-1}}{A_{a+b}^k} = \frac{a}{a+b}.$$

□

即 k 个人取球虽先后次序不同, 各人取得白球的概率是一样的. 放不放回概率也一样一样. 类似地买彩票, 抽奖, 抓阄等.

例 (随机数整除模型)

从 $1 \sim 2000$ 的整数中随机地取一个数. 问取到的整数既不能被 6 整除, 又不能被 8 整除的概率是多少?

例 (随机数整除模型)

从 $1 \sim 2000$ 的整数中随机地取一个数. 问取到的整数既不能被 6 整除, 又不能被 8 整除的概率是多少?

解: 记 A 为事件能被 6 整除. 记 B 为事件能被 8 整除.

$$\begin{aligned}P(\bar{A}\bar{B}) &= P(\overline{A \cup B}) \\&= 1 - P(A \cup B) \\&= 1 - (P(A) + P(B) - P(AB)).\end{aligned}$$

其中 $P(A) = \frac{333}{2000}$, $P(B) = \frac{250}{2000}$, $P(AB) = \frac{83}{2000}$ (被最小公倍数 24 整除).

所以 $P(\bar{A}\bar{B}) = \frac{1500}{2000} = \frac{3}{4}$.

□

例 (配对问题)

从 6 双不同的鞋子中任取 4 只, 问

- (1) 恰有两只配对成双的概率.
- (2) 至少有两只配对成双的概率.

例 (配对问题)

从 6 双不同的鞋子中任取 4 只, 问

- (1) 恰有两只配对成双的概率.
- (2) 至少有两只配对成双的概率.

解: (1)
$$P = \frac{C_6^1 C_5^2 C_2^1 C_2^1}{C_{12}^4} = \frac{16}{33}.$$

(2)
$$P = 1 - \frac{C_6^4 C_2^1 C_2^1 C_2^1 C_2^1}{C_{12}^4}.$$

□

例

将 15 名新生随机地平均分配到三个班级中去, 这 15 名新生中有 3 名优秀. 问

- (1) 每个班级分配到一名优秀的概率.
- (2) 3 名优秀分配到同一个班级的概率.

例

将 15 名新生随机地平均分配到三个班级中去, 这 15 名新生中有 3 名优秀. 问

(1) 每个班级分配到一名优秀的概率.

(2) 3 名优秀分配到同一个班级的概率.

解: (1) 总样本点 $C_{15}^5 C_{10}^5 C_5^5$, 每个班级 $3! C_{12}^4 C_8^4 C_4^4$.

$$P = \frac{3! C_{12}^4 C_8^4 C_4^4}{C_{15}^5 C_{10}^5 C_5^5}.$$

$$(2) P = \frac{C_3^1 C_{12}^2 C_{10}^5 C_5^5}{C_{15}^5 C_{10}^5 C_5^5}.$$

□

例

设有甲、乙、丙三个班级，思考下面试验的样本点数分别是多少？

(1) 15 名新生随机地平均分配到三个班级；

例

设有甲、乙、丙三个班级，思考下面试验的样本点数分别是多少？

- (1) 15 名新生随机地平均分配到三个班级；
- (2) 15 名新生随机分配到三个班级中，要求其中一个班分 3 人，一个班分 5 人，一个班分 7 人；

例

设有甲、乙、丙三个班级，思考下面试验的样本点数分别是多少？

- (1) 15 名新生随机地平均分配到三个班级；
- (2) 15 名新生随机分配到三个班级中，要求其中一个班分 3 人，一个班分 5 人，一个班分 7 人；
- (3) 15 名新生随机分配到三个班级中，要求甲班分 3 人，乙班分 5 人，丙班分 7 人；

例

设有甲、乙、丙三个班级，思考下面试验的样本点数分别是多少？

- (1) 15 名新生随机地平均分配到三个班级；
- (2) 15 名新生随机分配到三个班级中，要求其中一个班分 3 人，一个班分 5 人，一个班分 7 人；
- (3) 15 名新生随机分配到三个班级中，要求甲班分 3 人，乙班分 5 人，丙班分 7 人；
- (4) 15 名新生随机分配到三个班级中，要求其中一个班分 3 人，其余两个班分别分 6 人；

解:

$$(1) C_{15}^5 C_{10}^5 C_5^5;$$

$$(2) C_{15}^3 C_{12}^5 C_7^7 \cdot A_3^3;$$

$$(3) C_{15}^3 C_{12}^5 C_7^7;$$

$$(4) C_{15}^3 C_{12}^6 C_6^6 \cdot 3.$$



例

某接待站在某一周曾接待过 12 次来访, 已知所有这 12 次接待都是在周二和周四. 问是否可推断接待时间是规定的?

例

某接待站在某一周曾接待过 12 次来访, 已知所有这 12 次接待都是在周二和周四. 问是否可推断接待时间是规定的?

解: 假设没有规定. 每天的接待是等可能的.
总样本点 7^{12} . 12 次接待都是周二和周四 2^{12} .

$$P = \frac{2^{12}}{7^{12}} = 0.0000003.$$

小概率事件在一次试验中几乎是不可能发生的 (实际推断原理).

所以, 可推断接待时间是规定的. □