

线性代数-3

主讲：吴利苏

wulisu@sdust.edu.cn

山东科技大学，数学学院

本次课内容

1. 行列式的展开
2. Vandermonde 行列式
3. 行列式与线性方程组

- 行列式的定义

$$\begin{aligned} \left| \begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{array} \right| &= \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{t(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n} \\ &= a_{11} M_{11} - a_{12} M_{12} + \cdots + (-1)^{1+n} a_{1n} M_{1n} \\ &= (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1} + \cdots + (-1)^{i+n} a_{in} M_{in} \end{aligned}$$

(定理 2)

● 行列式的六条性质

- 1) $D^T = D$.
- 2) 交换两行 (列), 则行列式变号.
- 3) 某行 (列) 乘数 k , 则行列式乘数 k .
- 4) 两行 (列) 成比例, 则行列式为零.
- 5) 一行 (列) 可加, 则行列式可加.
- 6) 某行 (列) 的 k 倍加到另一行 (列) 上去, 则行列式不变.

● 行列式的三种操作

- $r_i \leftrightarrow r_j$.
- $r_i \times k$.
- $r_j + r_i \times k$.

行列式的展开定理

定理 (行列式的展开)

行列式等于它的任一行 (列) 的各元素与其对应的代数余子式乘积之和, 即

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}, \quad i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

或

$$D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}, \quad j \in \{1, 2, \dots, n\}$$

其中 $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$.

注: $i = 1$ 时, 即 n 阶行列式的归纳定义.

余子式和代数余子式

- 在 n 阶行列式中, 划去 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列后, 留下来的 $n-1$ 阶行列式叫做元素 a_{ij} 的余子式, 记作 M_{ij} ;
- $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 称为 a_{ij} 的代数余子式.
- 例如四阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

的 a_{32} 的余子式和代数余子式.

$$M_{32} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}, \quad A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = -M_{32}$$

行列式的降阶

引理

一个 n 阶行列式，如果其中第 i 行所有元除 a_{ij} 外都为零，那么这行列式等于 a_{ij} 与它的代数余子式的乘积，即

$$D = a_{ij}A_{ij}$$

例

计算

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$$

行列式的展开

定理 (行列式的展开)

行列式等于它的任一行 (列) 的各元素与其对应的代数余子式乘积之和, 即

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}, \quad i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

或

$$D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}, \quad j \in \{1, 2, \dots, n\}$$

行列式的展开

定理 (行列式的展开)

行列式等于它的任一行 (列) 的各元素与其对应的代数余子式乘积之和, 即

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}, \quad i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

或

$$D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}, \quad j \in \{1, 2, \dots, n\}$$

推论

$i \neq j$ 时,

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = 0$$

$$(a_{1i}A_{1j} + a_{2i}A_{2j} + \cdots + a_{ni}A_{nj} = 0)$$

例题

例
设

$$D = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$$

求 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14}$ 和 $M_{11} + M_{21} + M_{31} + M_{41}$.

解:

Vandermonde 行列式

定理

证明 Vandermonde 行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j)$$

证明：

行列式与线性方程组

设含有 n 个未知量 n 个线性方程的方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (1)$$

令

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

D 称为线性方程组的系数行列式.

行列式与线性方程组

令

$$D_i = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,i-1} & b_1 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,i-1} & b_2 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,i-1} & b_n & a_{1,i+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

定理 (Carmer 法则)

若 $D \neq 0$, 则线性方程组 (1) 有唯一解

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, \dots, x_n = \frac{D_n}{D}.$$

课堂练习

例

用 Carmer 法则求解线性方程组


$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 2 \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0 \end{cases}$$

解：

补充：Vandermonde 行列式的一个背景

例（以物换物）

现有两个原始部落，一个部落只有野兔，另一个部落只有野鸡。两个部落一直都有交换野兔和野鸡的传统。两部落兔鸡交换比例大致如下：



现要求建立一个一元三次函数的交易模型。

- 行列式的展开定理

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = \begin{cases} D, & i = j \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

- Vandermonde 行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j)$$

- Cramer 法则

作业

- 按时完成线上课程任务.
- P22-23. 6-(4)、8-(2)(3)、9.

欢迎提问和讨论

吴利苏 (<http://wulisu.cn>)

Email: wulisu@sdust.edu.cn