

线性代数-8

主讲：吴利苏

wulisu@sdust.edu.cn

山东科技大学，数学学院

回顾：矩阵的初等变换和等价

- 矩阵的三种初等行变换：

回顾：矩阵的初等变换和等价

- 矩阵的三种初等行变换：
 - 交换两行， $r_i \leftrightarrow r_j$ ；

回顾：矩阵的初等变换和等价

- 矩阵的三种初等行变换：
 - 交换两行, $r_i \leftrightarrow r_j$;
 - 某一行乘非零常数倍, $r_i \times k$;

回顾：矩阵的初等变换和等价

- 矩阵的三种初等行变换：
 - 交换两行, $r_i \leftrightarrow r_j$;
 - 某一行乘非零常数倍, $r_i \times k$;
 - 某行加上另外一行的 k 倍, $r_i + kr_j$.

回顾：矩阵的初等变换和等价

- 矩阵的三种初等行变换：
 - 交换两行, $r_i \leftrightarrow r_j$;
 - 某一行乘非零常数倍, $r_i \times k$;
 - 某行加上另外一行的 k 倍, $r_i + kr_j$.
- 矩阵的等价：

回顾：矩阵的初等变换和等价

- 矩阵的三种初等行变换：

- 交换两行, $r_i \leftrightarrow r_j$;
- 某一行乘非零常数倍, $r_i \times k$;
- 某行加上另外一行的 k 倍, $r_i + kr_j$.

- 矩阵的等价：

- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} B$, 则称 A, B 行等价, 记为 $A \sim B$;

回顾：矩阵的初等变换和等价

- 矩阵的三种初等行变换：

- 交换两行, $r_i \leftrightarrow r_j$;
- 某一行乘非零常数倍, $r_i \times k$;
- 某行加上另外一行的 k 倍, $r_i + kr_j$.

- 矩阵的等价：

- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} B$, 则称 A, B 行等价, 记为 $A \sim^r B$;
- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} B$, 则称 A, B 列等价, 记为 $A \sim^c B$;

回顾：矩阵的初等变换和等价

- 矩阵的三种初等行变换：

- 交换两行, $r_i \leftrightarrow r_j$;
- 某一行乘非零常数倍, $r_i \times k$;
- 某行加上另外一行的 k 倍, $r_i + kr_j$.

- 矩阵的等价：

- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} B$, 则称 A, B 行等价, 记为 $A \sim^r B$;
- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} B$, 则称 A, B 列等价, 记为 $A \sim^c B$;
- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等变换}} B$, 则称 A, B 等价, 记为 $A \sim B$.

本次课内容

1. 行阶梯形矩阵、行最简形矩阵、标准矩阵
2. 初等变换和初等矩阵
3. 初等变换的应用

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 \times \frac{1}{2}]{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \\ 2 & -3 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$\xrightarrow[r_3 - 2r_1]{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & -5 & 5 & -10 \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$\xrightarrow[r_3 \times (-\frac{1}{3})]{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$\xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4)$$

- 通过六步初等变换，矩阵下方的 0 不断变多.
- 矩阵 (3) 和 (4) 下方的零构成一个阶梯形状.

行阶梯形矩阵

- 行阶梯形矩阵：

- 可画出一条阶梯线，线的下方全是 0；
- 每个台阶只有一行；
- 阶梯线的竖线后面是非零行的第一个非零元素.

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 2 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

行阶梯形矩阵

- 行阶梯形矩阵：

- 可画出一条阶梯线，线的下方全是 0；
- 每个台阶只有一行；
- 阶梯线的竖线后面是非零行的第一个非零元素.

$$\left(\begin{array}{ccccc} |1 & 1 & 2 & 2 & -3 \\ |0 & 2 & -1 & 0 & -4 \\ |0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ |0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- 反例：

$$\left(\begin{array}{ccccc} |1 & 1 & 2 & 2 & -3 \\ |0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ |0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ |0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{ccccc} |1 & 1 & 2 & 2 & -3 \\ |0 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ |0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ |0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

行最简形矩阵、标准形矩阵

- 行最简形矩阵：

- 行阶梯形；
- 非 0 行的首个非 0 元为 1；
- 这些非 0 元所在的列其他元素都为 0.

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

行最简形矩阵、标准形矩阵

- 行最简形矩阵:

- 行阶梯形;
- 非 0 行的首个非 0 元为 1;
- 这些非 0 元所在的列其他元素都为 0.

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- 标准形矩阵:

$$F = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$$

行最简形矩阵、标准形矩阵

- 行最简形矩阵:

- 行阶梯形;
- 非 0 行的首个非 0 元为 1;
- 这些非 0 元所在的列其他元素都为 0.


$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- 标准形矩阵:

$$F = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$$

- 行阶梯形矩阵 \supset 行最简形矩阵 \supset 标准形矩阵.

命题



例题

例

将下面矩阵化为标准形

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & -3 \\ -3 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

初等变换和初等矩阵

- 将单位矩阵 E 经过一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵 (Elementary Matrix).

初等变换和初等矩阵

- 将单位矩阵 E 经过一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵 (Elementary Matrix).
- 三种初等变换：
 - $r_i \leftrightarrow r_j, c_i \leftrightarrow c_j;$
 - $r_i \times k, c_i \times k (k \neq 0);$
 - $r_i + kr_j, c_i + kc_j.$

$r_i \leftrightarrow r_j$ 和 $E_m(i, j)$

- 交换单位阵 E 的第 i, j 行 (列), 记为 $E_m(i, j)$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E_4(1, 3)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1 \leftrightarrow c_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E_4(1, 3)$$

$r_i \times k$ 和 $E_m(i(k))$

- 单位阵 E 的第 i 行 (列) 乘非 0 常数 k , 记为 $E_m(i(k))$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \times k} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E_4(2(k))$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 \times k} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E_4(2(k))$$

$r_i + kr_j$ 和 $E_m(ij(k))$

- 单位阵 E 的第 i 行加上第 j 行的 k 倍, 记为 $E_m(ij(k))$. 或
单位阵 E 的第 j 列加上第 i 列的 k 倍, 记为 $E_m(ij(k))$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3+kr_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ k & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E_4(31(k))$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1+kc_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ k & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E_4(31(k))$$

初等变换和初等矩阵

- A 左边乘初等矩阵 \Leftrightarrow 对 A 进行相应初等行变换.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{pmatrix}$$

- A 右边乘初等矩阵 \Leftrightarrow 对 A 进行相应初等列变换.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{pmatrix}$$

初等变换和初等矩阵

- $E_m(i, j)A_{m \times n} \Leftrightarrow r_i \leftrightarrow r_j;$
- $A_{m \times n}E_n(i, j) \Leftrightarrow c_i \leftrightarrow c_j;$
- $E_m(i(k))A_{m \times n} \Leftrightarrow r_i \times k;$
- $A_{m \times n}E_n(i(k)) \Leftrightarrow c_i \times k;$
- $E_m(ij(k))A_{m \times n} \Leftrightarrow r_i + kr_j;$
- $A_{m \times n}E_n(ij(k)) \Leftrightarrow$

初等变换和初等矩阵

- $E_m(i, j)A_{m \times n} \Leftrightarrow r_i \leftrightarrow r_j;$
- $A_{m \times n}E_n(i, j) \Leftrightarrow c_i \leftrightarrow c_j;$
- $E_m(i(k))A_{m \times n} \Leftrightarrow r_i \times k;$
- $A_{m \times n}E_n(i(k)) \Leftrightarrow c_i \times k;$
- $E_m(ij(k))A_{m \times n} \Leftrightarrow r_i + kr_j;$
- $A_{m \times n}E_n(ij(k)) \Leftrightarrow c_j + kc_i.$

性质 (左行右列)

矩阵 $A_{m \times n}$ 进行一次初等行变换, 相当于左边乘一个 m 阶初等矩阵;
矩阵 $A_{m \times n}$ 进行一次初等列变换, 相当于右边乘一个 n 阶初等矩阵。

初等变换和初等矩阵

- 初等变换的逆矩阵对应初等矩阵的逆矩阵：

- $E(i, j)^{-1} = E(i, j);$
- $E(i(k))^{-1} = E(i(\frac{1}{k}));$
- $E(ij(k))^{-1} = E(ij(-k)).$

初等矩阵和可逆矩阵

性质

方阵 A 可逆的充分必要条件是存在有限个初等矩阵 P_1, P_2, \dots, P_l ,
使得 $A = P_1 P_2 \cdots P_l$.

初等矩阵和可逆矩阵

性质

方阵 A 可逆的充分必要条件是存在有限个初等矩阵 P_1, P_2, \dots, P_l ,
使得 $A = P_1 P_2 \cdots P_l$.

推论

可逆矩阵 A 的标准形是单位阵.

矩阵的等价和初等矩阵

定理

A, B 都为 $m \times n$ 矩阵, 则

- $A \stackrel{r}{\sim} B$ 当且仅当存在 m 阶可逆矩阵 P , 使 $PA = B$;
- $A \stackrel{c}{\sim} B$ 当且仅当存在 n 阶可逆矩阵 Q , 使 $AQ = B$;
- $A \sim B$ 当且仅当存在 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q , 使 $PAQ = B$.

矩阵的等价和初等矩阵

定理

A, B 都为 $m \times n$ 矩阵, 则

- $A \xrightarrow{r} B$ 当且仅当存在 m 阶可逆矩阵 P , 使 $PA = B$;
- $A \xrightarrow{c} B$ 当且仅当存在 n 阶可逆矩阵 Q , 使 $AQ = B$;
- $A \sim B$ 当且仅当存在 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q , 使 $PAQ = B$.

推论

方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow A \xrightarrow{r} E \Leftrightarrow A \xrightarrow{c} E \Leftrightarrow A \sim E$.

初等变换的应用 1

- 应用 1：已知矩阵 A, B 等价，求可逆矩阵 P ，使得 $PA = B$.

初等变换的应用 1

- 应用 1：已知矩阵 A, B 等价，求可逆矩阵 P ，使得 $PA = B$.

$$P(A : E) = (PA : P) = (B : P)$$

$$(A : E) \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} (B : P)$$

初等变换的应用 1

- 应用 1：已知矩阵 A, B 等价，求可逆矩阵 P ，使得 $PA = B$.

$$P(A : E) = (PA : P) = (B : P)$$

$$(A : E) \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} (B : P)$$

- 思路：对 $(A : E)$ 作初等行变换，把 A 变为 B ，则单位阵 E 记录了相应初等行变换化为可逆矩阵 P .

例子

例

设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 4 & -6 & 2 \end{pmatrix}$ 的行最简形矩阵为 F , 求 F . 并求一个可逆矩阵 P , 使得 $PA = F$.

例子

例

设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 4 & -6 & 2 \end{pmatrix}$ 的行最简形矩阵为 F , 求 F . 并求一个可逆矩阵 P , 使得 $PA = F$.

- 这里的 P 不唯一. (A 可逆时, P 唯一.)

- 应用 2：判断方阵 A 是否可逆并求逆矩阵. 即 $PA = E$ 是否能求出可逆 P .

初等变换的应用 2

- 应用 2：判断方阵 A 是否可逆并求逆矩阵. 即 $PA = E$ 是否能求出可逆 P .

$$P(A : E) = (PA : P) = (E : P = A^{-1})$$

$$(A : E) \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} (B : A^{-1})$$

初等变换的应用 2

- 应用 2：判断方阵 A 是否可逆并求逆矩阵. 即 $PA = E$ 是否能求出可逆 P .

$$P(A : E) = (PA : P) = (E : P = A^{-1})$$

$$(A : E) \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} (B : A^{-1})$$

- 思路：方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow A \stackrel{r}{\sim} E$. 对 $(A : E)$ 作初等行变换，把 A 变为 E ，则 $(A : E)$ 中的单位阵 E 记录了相应初等行变换化为 A^{-1} .
- 注：也可

$$\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} \begin{pmatrix} E \\ A^{-1} \end{pmatrix}$$

例子

例

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, 证明 A 可逆, 并求 A^{-1} .

初等变换的应用 3

- 应用 3: 求 $A^{-1}B$ 和 BA^{-1} .
(更一般地, 解矩阵方程 $AX = B$ 和 $XA = B$.)

初等变换的应用 3

- 应用 3: 求 $A^{-1}B$ 和 BA^{-1} .
(更一般地, 解矩阵方程 $AX = B$ 和 $XA = B$.)

$$P(A : B) = (PA : PB) = (E : A^{-1}B)$$

$$(A : B) \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} (E : A^{-1}B)$$

初等变换的应用 3

- 应用 3: 求 $A^{-1}B$ 和 BA^{-1} .
(更一般地, 解矩阵方程 $AX = B$ 和 $XA = B$.)

$$P(A : B) = (PA : PB) = (E : A^{-1}B)$$

$$(A : B) \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} (E : A^{-1}B)$$

- 思路: 方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow A \xrightarrow{r} E$. 对 $(A : B)$ 作初等行变换, 把 A 变为 E , 则 B 记录了相应初等行变换化为 $A^{-1}B$.
- 注: 也可 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} \begin{pmatrix} E \\ BA^{-1} \end{pmatrix}$ 求 BA^{-1} .

例

求解矩阵方程 $AX = B$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

初等变换和线性方程组求解

例

求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 2 \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0. \end{cases}$$

- 1、行阶梯形矩阵、行最简形矩阵、标准形矩阵；
- 2、初等矩阵和初等变换；
- 3、初等变换的应用。
 - 求 A^{-1} ；
 - 解矩阵方程 $AX = B$ 和 $XA = B$.

作业

- P77-P78. 1-(4), 2, 4-(2), 6-(1).

欢迎提问和讨论

吴利苏 (<http://wulisu.cn>)

Email: wulisu@sdu.edu.cn

2022 年 9 月 26 日