

11.10.

设三阶方阵 A 的特征值为: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 3$, $B = A^3 - 7A + 5E$,

则 $|B|$ 等于 ().

11月10日 ref Page-139: 12、13; lecture-16-slides: 例8

A 相似 $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$, $B = \varphi(A)$. ref Page-123.

① $|B| = k_1 \cdot k_2 \cdot k_3$ 特征值乘积

② λ 为 A 特征值, 则 $\varphi(\lambda)$ 为 $\varphi(A)$ 特征值.

$$k_1 = \varphi(1) = -1$$

$$k_2 = \varphi(2) = -1$$

$$k_3 = \varphi(3) = 11$$

$$\therefore |B| = k_1 \times k_2 \times k_3 = 11$$

$$\begin{aligned} \text{注: } \varphi(x) &= x^3 - 7x + 5 \\ &= x^3 + 0 \cdot x^2 - 7x^1 + 5x^0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \varphi(A) &= A^3 + 0 \cdot A^2 - 7A^1 + 5A^0 \\ &= A^3 - 7A + 5E \end{aligned}$$

而不是 $A^3 - 7A + 5$.

11.11

2、设 4 元/非齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 3，已知 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 是它的 3 个解向量，
考查非齐次线性方程组解的结构

$\vec{a}_1 = (2, 3, 4, 5)^T, \vec{a}_2 + \vec{a}_3 = (2, 4, 6, 8)^T$ ，则该方程组的通解为 11.11

① $AX=0$ 基础解系包含向量个数

$$n - R(A) = 4 - 3 = 1$$

② 若 $R(A) = n - 1$ ， ξ 为 $AX=0$ 的一个非零解。

则 $\forall C \in \mathbb{R}$ ， $C\xi$ 也为 $AX=0$ 的非零解。

即 $C\xi, \forall C \neq 0$ 都可作为 $AX=0$ 的基础解系

③ $R(A) = n - 1$ ，则 $AX=\beta$ 通解形式为

$$X = k\xi + \eta^*, \quad \forall k \in \mathbb{R}.$$

取 $\eta^* = \vec{a}_1$ 设
$$\begin{cases} \vec{a}_1 = k_1\xi + \eta^* = \eta^* \\ \vec{a}_2 = k_2\xi + \eta^* \\ \vec{a}_3 = k_3\xi + \eta^* \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} \eta^* = (2, 3, 4, 5)^T \\ \vec{a}_2 + \vec{a}_3 - 2\vec{a}_1 = (k_2 + k_3)\xi = (-2, -2, -2, -2)^T \end{cases}$$

$\therefore \xi, (k_2 + k_3)\xi = (-2, -2, -2, -2)^T, -\frac{k_2 + k_3}{2} = (1, 1, 1, 1)^T$ 都可
作为 $AX=0$ 基础解系

($\rightarrow$ 定代入数 $\rightarrow$) $X = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \forall k \in \mathbb{R}.$

11.12

2、下列关于矩阵的秩的说法正确的是 ()

(A) $R(A+B) \leq R(A)+R(B)$; X

(B) 若 $R(A)=R(B)$, 则 A 与 B 等价; X, 同型

(C) 合同矩阵的秩相等; 11.12 等价不变量

(D) 相似矩阵的秩不一定相等。 X

回顾

① 同型 A, B 等价 $\Leftrightarrow \exists$ 可逆 P, Q , s.t. $PAQ=B$. ①
 $\Leftrightarrow R(A)=R(B)$

② A, B 合同 $\Leftrightarrow \exists$ 可逆 P , s.t. $P^TAP=B$. ②

③ A, B 相似 $\Leftrightarrow \exists$ 可逆 P , s.t. $P^{-1}AP=B$. ③

$\therefore$ 合同, 相似 $\Rightarrow$ 等价 $\Rightarrow$ 秩不变.

B 错: A, B 可能不同型, 如 $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

C $\checkmark$

D $\times$

A: 令 $A=B=E$, 则 $R(2E) \geq 2R(E) \Leftrightarrow n \geq 2n$ 错误
 应为 $R(A+B) \leq R(A)+R(B)$.

2. 设 A 为四阶方阵, 且 $|A|=2$, 则 $\left| \left(\frac{1}{2}A \right)^{-1} - 3A^* \right| = \underline{\quad 11.13 \quad}$.

$$\textcircled{1} |kA| = k^n |A| \neq k \cdot |A|$$

$$\textcircled{5} A^{-1} = \frac{A^*}{|A|} \quad \star$$

$$\textcircled{2} |A^{-1}| = \frac{1}{|A|} \quad (\Leftarrow A \cdot A^{-1} = E) \quad (A^* = |A| \cdot A^{-1})$$

$$\textcircled{3} (kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$$

$$\textcircled{6} A^*A = AA^* = |A| \cdot E \quad \star$$

$$\textcircled{4} |AB| = |A| \cdot |B|$$

解法1:

$$\begin{aligned} & \left| \left(\frac{1}{2}A \right)^{-1} - 3A^* \right| \\ & \stackrel{\textcircled{3}}{=} \left| 2 \cdot A^{-1} - 3A^* \right| \\ & \stackrel{\textcircled{5}}{=} \left| 2 \cdot A^{-1} - 3 \times 2 \cdot A^{-1} \right| \\ & = \left| -4A^{-1} \right| \\ & \stackrel{\textcircled{1}}{=} (-4)^4 \cdot |A^{-1}| \\ & \stackrel{\textcircled{2}}{=} 256 \cdot \frac{1}{2} = 128. \end{aligned}$$

解法2:

$$\begin{aligned} & \left| \left(\frac{1}{2}A \right)^{-1} - 3A^* \right| \cdot |A| \cdot \frac{1}{|A|} \\ & \stackrel{\textcircled{2} \textcircled{4}}{=} \left| \left(2A^{-1} - 3A^* \right) \cdot A \right| \times \frac{1}{2} \\ & = \frac{1}{2} \left| 2A^{-1}A - 3A^*A \right| \\ & \stackrel{\textcircled{6}}{=} \frac{1}{2} \left| 2E - 3|A| \cdot E \right| \\ & = \frac{1}{2} \left| -4E \right| \\ & \stackrel{\textcircled{7}}{=} \frac{1}{2} \times (-4)^4 \cdot |E| \\ & = 128. \end{aligned}$$

11.14

$$D_n = \begin{vmatrix} 2+a_1 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2+a_2 & \cdots & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 2 & 2 & \cdots & 2+a_n \end{vmatrix}, a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0.$$

复杂化简单

未知化已知

没见过的化见过的.

解1

$$\textcircled{1} \quad \begin{matrix} r_2 - r_1 \\ \vdots \\ r_n - r_1 \end{matrix} \quad D \quad \begin{vmatrix} 2+a_1 & 2 & \cdots & 2 \\ -a_1 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_1 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

化 { 低阶行列式
爪形行列式 ✓
Vandermonde行列式
循环行列式

← 爪形

$$\underline{C_1 + \frac{a_1}{a_2} C_2 + \cdots + \frac{a_1}{a_n} C_n} \quad \begin{vmatrix} 2+a_1 + 2\frac{a_1}{a_2} + \cdots + 2\frac{a_1}{a_n} & 2 & \cdots & 2 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

$$= \left(2+a_1 + 2\frac{a_1}{a_2} + \cdots + 2\frac{a_1}{a_n} \right) \cdot a_2 \cdots a_n$$

$$= \left(\frac{2}{a_1} + 1 + 2\frac{1}{a_2} + \cdots + 2\frac{1}{a_n} \right) a_1 \cdot a_2 \cdots a_n$$

$$= \left(1 + 2 \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right) \cdot \prod_{j=1}^n a_j$$

解2. $D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 2 & 2+a_1 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 2+a_2 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2+a_n \end{vmatrix}_{(n+1) \times (n+1)}$

$\begin{matrix} C_2-C_1 \\ \vdots \\ C_{n+1}-C_1 \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 2 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 2 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$

爪形

$r_1 + \frac{r_2}{a_1} + \cdots + \frac{r_{n+1}}{a_n}$

$= \begin{vmatrix} 1+2\frac{1}{a_1}+2\frac{1}{a_2}+\cdots+2\frac{1}{a_n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 2 & a_1 & & & \\ 2 & & a_2 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 2 & & & & a_n \end{vmatrix}$

$= (1+2\frac{1}{a_1}+\cdots+2\frac{1}{a_n}) \cdot a_1 a_2 \cdots a_n$

$= (1+2\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}) \cdot \prod_{j=1}^n a_j$

11/15.

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $AB = A + 2B$, 求 B .

解: $AB = A + 2B$

$\therefore (A - 2E)B = A$

$\therefore A - 2E = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

$(A - 2E, A) = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

方法=见左.

只可行变换
不可列变换

$\xrightarrow{\substack{r_1 + 2r_2 \\ r_1 + r_3}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 2 & 5 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{r_1 - r_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$

解矩阵方程

若 $A - 2E$ 可逆.

则 $B = (A - 2E)^{-1}A$

方法-: 先判断 $A - 2E$ 可逆, 并求 $(A - 2E)^{-1}$ 再求 B . (不推荐).

$$\xrightarrow{r_1 \times \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 - r_1} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1 + r_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

E

$$\therefore A - 2E \text{ 可逆, 且 } B = (A - 2E)^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

6、(12分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_2x_3$ ，求正交变换 $x = Py$ 将其化为标准型，并判断该二次型是否为正定二次型？

11/16.

解：二次型 f 的矩阵.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & -2 \\ 0 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix}$$

一般情况时.
由于这里须对结果
因式分解故建议
用降阶法. 提因式
不推荐用对角线法

$$= (\lambda - 2) \cdot ((\lambda - 1)^2 - 4)$$

$$= (\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda + 1)$$

$\therefore \lambda = -1, 2, 3$ 为 A 的特征值.

当 $\lambda = -1$ 时, $(-E - A)X = 0$

$$(-E - A) = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

求解方程组 $\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$

$\therefore \xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 为 $\lambda = -1$ 的特征向量.

当 $\lambda = 2$ 时, $(2E - A)X = 0$

$$2E - A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$\therefore \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 为 $\lambda = 2$ 的特征向量.

当 $\lambda = 3$ 时, $(3E - A)X = 0$.

$$3E - A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\therefore \xi_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 为 } \lambda = 3 \text{ 的特征向量.}$$

$\therefore A$ 为对称阵, $\therefore \xi_1, \xi_2, \xi_3$ 两两正交.

$$\therefore \text{令 } P = \left(\frac{\xi_1}{\|\xi_1\|}, \frac{\xi_2}{\|\xi_2\|}, \frac{\xi_3}{\|\xi_3\|} \right)$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

$$\text{则 } P^{-1}AP = P^TAP = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}.$$

$\therefore X = PY$ 时, 有

$$f(Y) = Y^T \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix} Y = -y_1^2 + 2y_2^2 + 3y_3^2.$$

正定性判断, 方法1.

$\because f$ 有负特征值, $\therefore f$ 不正定. $\square$

— 方法2

$$2 > 0 \quad \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 > 0.$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -6 < 0.$$

$\therefore f$ 不正定.

1. (14 分) 问 λ 取何值时, 非齐次线性方程组

$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda. \end{cases}$$

(1) 有唯一解; (2) 无解; (3) 有无穷多个解, 并在无穷多个解时, 求方程组的通解.